

Matemática Discreta

Unidade 20: Recorrências (3)

Renato Carmo
David Menotti

Departamento de Informática da UFPR

Segundo Período Especial de 2020

Generalização da ideia das unidades anteriores

Generalização da ideia das unidades anteriores

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

Generalização da ideia das unidades anteriores

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f, s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

Generalização da ideia das unidades anteriores

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f, s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

Generalização da ideia das unidades anteriores

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f, s: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$h: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$n_0 \in \mathbb{N}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n)$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n))) + s(h(n)) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n)$$

$$= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n)$$

$$= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^3(n)) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n)$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n)$$

$$= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n)$$

$$= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^3(n)) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n)$$

$$= \dots$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^3(n)) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= \dots \\ &= f(h^u(n)) + s(h^{u-1}(n)) + \dots + s(h^2(n)) + s(h^1(n)) + s(h^0(n)) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^3(n)) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= \dots \\ &= f(h^u(n)) + s(h^{u-1}(n)) + \dots + s(h^2(n)) + s(h^1(n)) + s(h^0(n)) \\ &= f(h^u(n)) + \sum_{i=0}^{u-1} s(h^i(n)) \end{aligned}$$

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

$$\begin{aligned} f(n) &= f(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= f(h(h^2(n))) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) = f(h^3(n)) + s(h^2(n)) + s(h(n)) + s(n) \\ &= \dots \\ &= f(h^u(n)) + s(h^{u-1}(n)) + \dots + s(h^2(n)) + s(h^1(n)) + s(h^0(n)) \\ &= f(h^u(n)) + \sum_{i=0}^{u-1} s(h^i(n)) \end{aligned}$$

$$u = \min \{k \in \mathbb{N} \mid h^k(n) < n_0\}$$

Resumo

se

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

Resumo

se

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

então

$$f(n) = f(h^u(n)) + \sum_{i=0}^{u-1} s(h^i(n))$$

Resumo

se

$$f(n) = f(h(n)) + s(n), \text{ para todo } n \geq n_0$$

então

$$f(n) = f(h^u(n)) + \sum_{i=0}^{u-1} s(h^i(n))$$

onde

$$u = \min \left\{ k \in \mathbb{N} \mid h^k(n) < n_0 \right\}$$